



आटिज्म से मिलते जुलते या साथ होने वाले विकार

आटिज्म के अलावा कुछ अवस्था और हैं जिनमें बच्चों का विकास और व्यवहार आटिज्म जैसा ही होता है। इनको जानना और पहचानना जरूरी है जिससे डायग्नोसिस सही हो। कुछ ऐसी अवस्थायें आटिज्म के साथ भी हो सकती हैं।

जब भी किसी बच्चे का आटिज्म का डायग्नोसिस हो तो यह सवाल पूछने चाहियें:

- a. “यह क्या वाकई आटिज्म है या कोई और अवस्था या विकार है?”
- b. “क्या इस बच्चे को आटिज्म के अलावा कोई और अवस्था या विकार भी है?”

यह माना गया है कि आटिज्म की जांच करते समय नीचे लिखे विकारों और अवस्थाओं की भी जांच होनी चाहिये:

- **विकास की विभिन्न अवस्थायें या विकार जो आटिज्म जैसी दिख सकती हैं:**
 - बोलने समझने में देरी या विकार
 - सीखने समझने में देरी या विकार
 - डिसप्रक्सिया या काम करने के सामंजस्य में कमजोरी या विकार (developmental coordination disorder (DCD)).
- **मानसिक और व्यवहारिक विकास में विभिन्नता या विकार:**
 - ध्यान देने में कमी के साथ अतिसक्रियता (attention deficit hyperactivity disorder (ADHD))
 - मानसिक विकार जैसे depression
 - मानसिक तनाव का विकार (anxiety disorder)
 - बच्चों में लगाव का विकार (attachment disorders)
 - व्यवहार/बर्ताव में विकार (oppositional defiant disorder (ODD))
 - एक ही बात या काम की धुन या खब्त रहने का विकार (obsessive compulsive disorder (OCD))
 - मानसिक सोच का विकार (psychosis).





- आटिज्म के अलावा विकास की कुछ दशायें जिनमें विकास में घटाव होता है - जैसे की बच्चा पहले सीखे हुए शब्द बोलना बंद कर दे:
 - रेट्स सिंड्रोम (Rett syndrome)
 - मिर्गी की वजह से मस्तिष्क विकृति (epileptic encephalopathy).
- अन्य अवस्थायें जो आटिज्म जैसी दिख सकी हैं या उसके साथ भी हो सकती हैं:
 - सुनने में बहुत ज्यादा कमी (severe hearing impairment)
 - दिखाई देने में बहुत ज्यादा कमी (severe visual impairment)
 - औरों के दुर्व्यहार व खराब देख रेख से पीड़ित बच्चा (maltreatment)
 - घर के बाहर औरों के सामने बोलने में परेशानी (selective mutism).

आटिज्म और अन्य अवस्थाओं में क्या फ़र्क हैं?

बोलने समझने के विकार (Language impairment (LI))

बोलने समझने के विकारों और आटिज्म में क्या समानताएं हैं	बोलने समझने के विकारों और आटिज्म में क्या विभिन्नता हैं
भाषा के समझने और इस्तेमाल करने में कमी होना	बोलने समझने के विकार वाले बच्चे, अपनी बात समझाने के लिए, हाथ और चेहरे के हाव-भाव का प्रयोग करते हैं.
खेलने की क्षमता के विकास में कमी होना	जिन बच्चों को आटिज्म है पर जिनकी बोलने की क्षमता ठीक है वह कुछ विभिन्न तरीके से बोलते हैं और अपनी भाषा का ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते.
मेलजोल के लिए बातचीत करने की क्षमता में कमी	बोलने समझने के विकारों में भाषा समझने की क्षमता बोल पाने की क्षमता से बेहतर होती है, लेकिन आटिज्म में ठीक इसके विपरीत होता है.
और बच्चों से मित्रता करने में मुश्किल	पहले सुनी बातों को दुहराना, एक ही तरह के काम को बार बार करना, गिनी चुनी चीज़ों में ही रुझान लेना आटिज्म में ज्यादा और भाषा के विकारों में कम होता है.





सीखने समझने में देरी या विकार (Intellectual disability (ID)/global developmental impairment)

सीखने समझने में देरी या विकार और आटिज्म में क्या समानताएं हैं	सीखने समझने में देरी या विकार और आटिज्म में क्या विभिन्नता हैं
भाषा की समझ और प्रयोग में कमी	सीखने समझने में देरी या विकार होने वाले बच्चों में औरों से मेल जोल में रुचि होती है
खेलने की क्षमता के विकास में कमी होना	सीखने समझने में देरी या विकार होने वाले बच्चे औरों से मेल जोल में पारस्परिकता दिखाते हैं
मेलजोल के लिए बातचीत करने की क्षमता में कमी	कुछ संवेदनाओं और कुछ चीजों में बहुत ज्यादा रुचि लेना आटिज्म में ज्यादा होता है.
और बच्चों से मित्रता करने में मुश्किल	सीखने समझने में देरी या विकार होने वाले बच्चों में औरों से मेल जोल की परेशानी उम्र बढ़ने पर ज्यादा सामने आती है
जिन बच्चों को सीखने समझने में देरी या विकार के साथ आटिज्म भी हो वह कुछ ऐसे व्यवहार ज्यादा करते हैं जैसे: औरों से हटकर और अलग रहना, कुछ कामों को एक ही तरह से करना और अपने आप को स्वयं चोट पहुंचाना.	

डिसप्रक्सिया या काम करने के सामंजस्य में कमजोरी या विकार (developmental coordination disorder (DCD)/dyspraxia).

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
अपनी निजी जगह के बर्ताव की कम समझ	जिन बच्चों को DCD हो उन्हें औरों से मित्रता और बातचीत करने में रुचि होती है
काम करने के तरीके में भद्दापन	जिन बच्चों को DCD हो उनका खेल कल्पनाशील होता है
और बच्चों से मित्रता करने में मुश्किल	कुछ संवेदनाओं और चीजों में बहुत ज्यादा रुचि लेना आटिज्म में ज्यादा होता है.
जिन बच्चों को आटिज्म और DCD दोनों हों उनकी पहली डायग्नोसिस अक्सर DCD होती है	





ध्यान देने में कमी के साथ अतिसक्रियता (attention deficit hyperactivity disorder (ADHD))

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
ध्यान देने में कमी, अतिसक्रिय - हर समय भाग दोड़ सी करना, आवेगशील - बेसब्री	आटिज्म में अपने रुचि के काम या विषय में अच्छा ध्यान लगता है
बेसब्री से औरों की बातों या काम में दखल देना	ADHD में सामाजिक बातों और नियमों की समझ होती है पर उन्हें मान नहीं पाते
खतरों की समझ कम या ना होना	ADHD में आवेग या बेसब्री की वजह से खतरा होता है जबकि आटिज्म में खतरे की समझ कम या नहीं होती
और बच्चों से मित्रता करने में मुश्किल	ADHD में औरों से मेल जोल करने में रुचि होती है और पारस्परिक व्यवहार भी कर सकते हैं
ADHD और आटिज्म दोनों अक्सर एक साथ भी होते हैं.	

मानसिक तनाव का विकार (anxiety disorder)

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
एक ही सवाल को बार बार दोहराना या बार बार आश्वासन चाहना	आटिज्म में एक ही तरह के सवाल, जैसे समय या उम्र के बारे में ज्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर उनके जवाब भी एक जैसे ही सुनना चाहते हैं.
समाजिक और सामूहिक स्थितियों से बचना	मानसिक तनाव के विकार में मेल जोल से बचना, घबराहट या डर की वजह से होता है. आटिज्म में औरों से जोले में रुचि ही कम होती है.
मानसिक तनाव के विकार या परेशानी आटिज्म के साथ भी अक्सर होती है.	

घर के बाहर औरों के सामने बोलने में परेशानी - सेलेक्टिव म्यूटिज्म (selective mutism)

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
औरों से बात चीत करने में परेशानी	सेलेक्टिव म्यूटिज्म में घर पर अच्छी तरह से मेल जोल और बातचीत कर पाते हैं
कभी कभी बोलने के विकास में कमजोरी	सेलेक्टिव म्यूटिज्म में बच्चे कल्पनाशील तरीके से खेलते हैं





मेल जोले व सामूहिक परिस्थियों में परेशानी	सेलेक्टिव म्यूटिस्म में न तो कुछ संवेदनाओं में या और चीजों में बहुत ज्यादा रुचि होती है न ही कोई अजीब शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं
---	---

एक ही बात या काम की धुन या खब्त रहने का विकार **obsessive compulsive disorder (OCD)**

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
एक ही तरह के काम करने में रुचि लेना	OCD की शुरुआत अक्सर चार साल की उम्र के बाद होती है
	OCD में मेल जोल में रुचि होती है
	OCD में बच्चे अपने धुन का काम (जैसे बार बार हाथ धोना) ना कर पाने पर परेशान हो जाते हैं
	आटिज्म में एक ही तरह का काम या एक ही तरह से कोई काम करना अक्सर परिवर्तन अच्छा ना लगने की वजह से होता है
OCD और आटिज्म एक साथ भी हो सकते हैं	

व्यवहार/बर्ताव में खराबी या विकार (**oppositional defiant disorder (ODD)**)

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
औरों से हमदर्दी ना दिखाना और अपनी गलती पर पछतावा ना करना	व्यवहार/बर्ताव में खराबी या विकार में अपने व्यवहार की समझ होती है पर उसे उचित सिद्ध करने की कोशिश की जाती है
और बच्चों से मित्रता करने में मुश्किल	व्यवहार/बर्ताव में खराबी या विकार में व्यवहार बच्चे को प्रेरित करने से बदल सकते हैं
	व्यवहार/बर्ताव में खराबी या विकार में बार बार दुहराने वाले व्यवहार नहीं होते और बच्चों का सामाजिक विकास भी सामान्य होता है.





	आटिज्म में बच्चों की रुचि उनके व्यवहार में होती है, दूसरों पर पड़नेवाले असर से उनका मतलब नहीं होता.
जिन बच्चों को आटिज्म होता है उनके भी व्यवहार में परेशानियाँ होती हैं.	

बच्चों में अपनों से लगाव का विकार (attachment disorders)

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
सामाजिक बर्ताव अलग या अजीब तरीके से करना जैसे अनजान लोगों से भी लगाव दिखाना	Attachment Disorder में बच्चे अपने असंतुलित बर्ताव से दूसरों का लगाव पाने कि कोशिश सी करते हैं; आटिज्म में ऐसा नहीं होता.
अपने माता पिता से ठीक से लगाव ना दिखाना	Attachment Disorder में बच्चे कल्पनाशील तरीके से खेलते हैं और किसी चीज में कोई गहरी या अजीब रुचि नहीं रखते
Attachment Disorder में बच्चे औरों के दुर्व्यहार व खराब देख रेख से पीड़ित होते हैं	

रेट्स सिंड्रोम (Rett syndrome)

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
विकास में घटाव होना - जैसे की बच्चा पहले सीखे हुए शब्द बोलना और दूसरों में रुचि लेना बंद कर दे	रेट्स सिंड्रोम में हाथों से कोई काम करने की, चलने की और संतुलन की क्षमता कम या खत्म हो जाती है
हाथों की बार बार एक सी ही और अजीब सी गतिविधि	आटिज्म में हाथों की गतिविधि रेट्स सिंड्रोम में दिखने वाली हाथ आपस में रगड़ने की गतिविधि से अलग होती हैं
	रेट्स सिंड्रोम में और लोगों में रुचि दिखाई देती है
	रेट्स सिंड्रोम में MECP2 जीन की खराबी होती है
रेट्स सिंड्रोम के साथ कुछ बच्चों को आटिज्म भी हो सकता है	





मिर्गी की वजह से मस्तिष्क विकृति Epileptic Encephalopathy (EE)/ Landau Kleffner Syndrome (LKS)

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
विकास में घटाव होना - जैसे की बच्चा पहले सीखे हुए शब्द बोलना और दूसरों में रुचि लेना बंद कर दे	LKS की शुरुआत दो से सात साल की उम्र में होती है, उससे पहले बच्चे का विकास सामान्य होता है
एक तरह के मिर्गी के दोरे Absence seizures में ऐसा लग सकता है जैसे बच्चा और लोगों में रुचि या ध्यान नहीं दे रहा हो	खेलने की क्षमता LKS में अक्सर ठीक होती है
	LKS में न तो कुछ संवेदनाओं में या और चीजों में बहुत ज्यादा रुचि होती है न ही कोई अजीब शारीरिक गतिविधियां होती हैं
	LKS में EEG में विशेष तरह की खराबी होती है

दिखाई देने में बहुत ज्यादा कमी (severe visual impairment) (VI)

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
आँखों से मेल जोले ना बना पाना, दूसरों से मिलकर ध्यान न लगा पाना	VI में दूसरों में रुचि और मिलनसारिता होती है
बोलने, खेलने के विकास में देरी	VI में बच्चे दूसरों से अपनी रुचि बांटते हैं और उनकी रुचि में शरीक होते हैं, वह खेलने में भी रुचि लेते हैं
कम चीजों में रुचि लेना	VI में बच्चे दूसरों से हमदर्दी प्रकट करते हैं
बार बार दोहराने वाले व्यवहार होते हैं	VI में शारीरिक गतिविधि दुसरे तरह की होती है जैसे आँखों को दबाना या शरीर को डोलना (rocking)
आटिज्म और VI एक साथ भी हो सकते हैं	

सुनने में बहुत ज्यादा कमी (severe hearing impairment) (HI)

आटिज्म से समानताएं	आटिज्म से विभिन्नता
भाषा की समझ और इस्तेमाल में परेशानी	HI में मिलनसारिता की रुचि और क्षमता ठीक होती है





औरों से मेल जोल कम करना और अलग थलग रहना	HI में बच्चे कल्पनाशील तरीके से खेलते हैं
	HI में बच्चे हाथ और चेहरे के हाव भाव का प्रयोग करते हैं
	HI में ना तो एक सी ही चीज़ों में बहुत ज्यादा रुचि होती है न ही कोई अजीब शारीरिक या और बार बार दुहराने वाली गतिविधियाँ होती हैं
आटिज्म और HI एक साथ भी हो सकते हैं	

कुछ विकार या अवस्थायें जो आटिज्म के साथ हो सकती हैं वह कितनी व्यापक हैं?

Conditions	Prevalence (%) in children with classical autism	Prevalence (%) in children with ASD	Population prevalence
Intellectual disability	76	65	3-14/1000
ADHD	41	45	3-5%
Anxiety	62	27	
Self-injurious behaviour	49	Not known	
OCD	37	8	
Depression	14	9	
Seizures	24	15	
Tourette syndrome	Not known	12	
Cerebral palsy	5	5	2/1000
Sleep problems	37	61	
Gastrointestinal problems	3	62	
Vision deficits	7	6	2/1000
Hearing deficits	3	8	1/1000

ⁱ Autism spectrum disorder in under 19s: recognition, referral and diagnosis. CG 128. NICE: Sept 2011.